


Оценка состояния здоровья

В БОЛЬШИНСТВЕ регионов мира люди стали более здоровыми и живут дольше благодаря улучшению медицинского обслуживания и условий жизни, а также более широкому распространению иммунизации, антибиотиков и более эффективных противозачаточных средств. Эта тенденция, вероятно, будет продолжаться, однако в некоторых регионах надежда ослабевает из-за замедления или прекращения прогресса в 1990-е годы, прежде всего в результате эпидемии СПИДа. Действительно, в странах Африки к югу от Сахары за период с 1990 по 2001 год средняя продолжительность


жизни сократилась с 50 до 46 лет. Кроме того, при сохранении нынешних темпов большинство регионов развивающегося мира не смогут достичь к 2015 году Целей в области развития на рубеже тысячелетия, относящихся к здравоохранению, включая снижение детской и материнской смертности и борьбу с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими болезнями. В настоящем разделе приводятся данные об изменениях в мировом здравоохранении и демографических условиях, а в четырех статьях на последующих страницах рассматривается значение хорошего состояния здоровья населения для экономического развития.




В результате улучшения здравоохранения увеличилась продолжительность жизни и...




снизились смертность детей младше 5 лет во всем мире.




Это, в свою очередь, привело к снижению коэффициентов фертильности ...




и, как следствие, к замедлению темпов роста населения.



Во всем мире коэффициент зависимости несовершеннолетних устойчиво снижается,



а коэффициент зависимости престарелых начинает расти.



Источник: Показатели мирового развития, Группа Всемирного банка, помещены в Интернете по адресу: <http://devdata.worldbank.org/dataonline/>.

НАСЕЛЕНИЕ развивающихся стран значительно чаще страдает от инфекционных заболеваний, чем жители развитых стран. Например, около 99 процентов всех смертей от СПИДа, туберкулеза и малярии приходится на развивающиеся страны. Для финансирования мероприятий, направленных на достижение коренного перелома в борьбе с этими болезнями, в 2001 году был создан Глобальный фонд ООН. СПИД наносит особенно сильный урон населению в развивающихся странах, а серьезные детские инфекционные заболевания и материнская смертность по-прежнему создают огромные проблемы. В то же время, неинфекционные заболевания, такие как болезни сердца и рак, уже создают огромную угрозу, которая

быстро растет по мере старения населения. В 2001 году одни только сердечно-сосудистые заболевания унесли более 13 миллионов жизней в развивающихся странах. Эта цифра ошеломляет — ведь в странах с высокими доходами смертность от всех причин составила 7,9 миллиона человек. Табак, один из главных виновников всех трех основных причин смертности в мире: сердечных заболеваний и инсульта; раковых заболеваний, особенно рака легких; и хронической закупорки легких, — уже сейчас убивает два миллиона человек в год в развивающихся странах, и ожидается, что за следующую четверть века число смертей, связанных с курением табака, более чем утроится.




Более 44,6 млн человек в мире заражено ВИЧ/СПИДом, большинство из них в странах Африки.



Источники: ЮНЭЙДС и Всемирная организация здравоохранения.



В 2001 году от СПИДа в странах Африки умерло 2,2 млн человек, а средняя продолжительность жизни снижается.




Источники: Показатели мирового развития, Группа Всемирного банка, помещенные в Интернет; "Disease Control Priorities Project Working Paper Number 20", November 2003 (Рабочий документ №20 за ноябрь 2003 года по проекту определения приоритетов в области предотвращения заболеваемости).

В 2000 году от туберкулеза скончалось примерно 1,7 млн человек; большинство новых случаев заражения зарегистрировано в странах с низкими доходами.



Источник: Всемирная организация здравоохранения.

По оценкам, в 2000 году малярия унесла 1,1 млн жизней, большинство из них — в Африке.



Источники: Всемирная организация здравоохранения; Группа Всемирного банка, Показатели мирового развития.




Неинфекционные заболевания и травмы являются причиной 63 процентов смертей в более бедных странах.



Источник: Всемирная организация здравоохранения.



Ожидается рост числа смертей от заболеваний, связанных с курением, особенно в развивающихся странах.



Источник: Всемирная организация здравоохранения.